DESCRIPCION DE UNA ESPECIE NUEVA DEL GENERO *BELOSTOMA* LATR.

(Belostomidae-Hemiptera)

por

José A. De Carlo

Entomólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Belostoma porteri sp. n.

Lám. XIII, figs. 1 y 3.

Long., 38-40 mm.; lat. máx., 16,8-18,5 mm.

Descripción del ejemplar holotipo:

Sexo: macho.

Long., 39,5 mm.; lat. máx., 18 mm.

Parte de la cabeza comprendida entre los ojos, de longitud apenas mayor que la porción anterior a los ojos; base del clípeo muy próxima al nivel de los vértices anteriores de los ojos; rostro largo, delgado, con el primer segmento marcadamente mayor que el segundo; ojos grandes, globosos.

Pronoto convexo; ancho del borde posterior, 12,5 mm.; largo en la línea media, 6,5 mm.

Escudete ligeramente carenado en la parte posterior media.

Membrana ampliamente valvante, con 17 nervios.

Fémures anteriores medianamente dilatados, un tercio más que los posteriores; tibias, exceptuando las posteriores, con tres anillos oscuros; fémures intermedios y posteriores con tres bandas oscuras.

Carena prosternal alta, de forma ojival.

Vellosidad sedosa, cubriendo la mitad externa de las márgenes laterales del abdomen, ensanchándose frente a los estigmas.

Clasper ancho, con el borde lateral externo marcadamente curvo.

Esta especie que tengo el honor de dedicar al distinguido naturalista chileno Prof. Dr. Carlos E. Porter, en homenaje a su infa-





1. *Belostoma porteri* sp. n.; 2. *Belostoma dentatum* Mayr; 3. Cabeza de *Belostoma porteri* sp. n.; 4. Cabeza de *Belostoma dentatum* Mayr.

tigable labor como director de la "Revista Chilena de Historia Natural" y por sus importantes trabajos en bien del mejor conocimiento de las Ciencias Naturales, se asemeja sobre todo a *B. dentatum* Mayr, por el tamaño de los segmentos del rostro, el grosor de los fémures anteriores, la vellosidad sedosa de los costados laterales del abdomen, forma de la carena prosternal y los ojos, pero se diferencia esencialmente, porque en *B. dentatum* Mayr la parte de la cabeza anterior a los ojos es un poco mayor que la porción interocular, además, la base del clípeo se halla bastante alejada del nivel de los vértices anteriores de los ojos; tampoco puede confundirse con *B. foveolatum* Mayr, porque en esta especie el primer segmento del rostro es apenas mayor que el segundo.

Montandon consideró a esta especie como perteneciente a *B. mayri* Berg. Tal hecho, se desprende de la lectura de la descripción que da Montadon en Bull. Soc. Sc. Bucarest, 1903, XII, N.° 1-2, páginas 116-117.

Belostoma mayri Berg = *Belostoma dentatum* Mayr, según lo he dado a conocer en Rev. Soc. Ent. Argentina, 1935, VII, págs. 204-205, lám. XVI, figs. 2, 4.

Alotipo, con las mismas características que el holotipo.

Holotipo, n.° cat. 46737; alotipo, n.° cat. 46738, y un paratipo macho, n.° cat. 46739, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Procedencia de los especímenes: holotipo, zona del canal de Panamá; alotipo, Las Guacas, Perú; paratipo, Mérida, Venezuela, col. por Juan Velar.

Un paratipo hembra y un paratipo macho de zona del canal de Panamá, en el Departamento de Zoología del "Iowa State College".